



SUOMEN KENNELLIITTO
FINSKA KENNELKLUBBEN RY.



ALANNE RIIKKA
PORAISTENTIE 524 A
07190 HALKIA

International Certificate

Lonkka/kynärniveldysplasia
Höftled/armbågsledsdysplasi
Hip/elbow dysplasia

Lausuntonumero
Utlåtandenummer
Certificate number

1064022

Koira - Hund - Dog

Nimi - Namn - Name	FAMME FATALE DETTA MAIRE
Rek.numero - Reg.number - Reg.no.	FI19456/11
TM - ID	968000005156359
Syntynyt - Född - Born	30.08.2010
Sukupuoli - Kön - Sex	narttu - tik - bitch
Rotu - Ras - Breed	grand griffon vendéen grand griffon vendéen Grand Griffon Vendéen

Kuvaus - Röntgen - X-ray

Kuvauspäivä - Röntgendifferenssi - X-ray date	10.03.2013
Kuvaaja - Veterinär - Veterinarian	ELLI KIVIKOSKI

Tutkimustulos - Bedömningsresultat - Classification result

Lausuntopäivä - Bedömningsdatum - Date of evaluation	26.03.2013
Lausunnon antaja - Avläsande veterinär - Evaluation made by	ANNIE LIMAN
Lonkkanivel - Höftled - Hip joint	
vasen - vänster - left	C
oikea - höger - right	C
Kynärniveli - Armbågsled - Elbow joint	
vasen - vänster - left	0
oikea - höger - right	0

02.04.2013

Röntgenkuvat on arvosteltu Suomen Kennelliitossa FCI:n säätöjen mukaisesti.
Röntgenbilderna har bedömts i Finska Kennelklubben enligt FCI's bestämmelser.
The evaluation was made at The Finnish Kennel Club according to the rules of F.C.I.

FCI:n lonkkanivelen arvosteluasteikko - FCI HD gradering - FCI HD classification

Dortmund 14.6.1991

<p>A</p> <p>Ei muutoksia. Reisiluun pää ja lonkkamaljakkko ovat yhdenmukaiset. Lonkkamaljakon kraniolateraalinen reuna piirty terävään ja on lievästi pyöristynyt. Nivelrako on tiivis ja tasainen. Norbergin asteikko vetoasennossa noin 105° (suosituksena).</p> <p>Normala höftleder. Ledknappen (caput) och ledskålen (acetabulum) är kongruenta. Den kraniolaterala acetabulumranden är skarp avtecknad, lätt avrundad. Ledspringan är smal och jämn. Norbergs vinkel (position 1) är ungefär 105 grader (rekommendation).</p> <p>No signs of hip dysplasia. The femoral head and the acetabulum are congruent. The craniolateral rim appears sharp and slightly rounded. The joint space is narrow and even. The acetabular angle according to Norberg (adapted for Pos. I) is about 105° (as a reference). In excellent hip joints the craniolateral rim encircles the femoral head somewhat more in laterocaudal direction.</p>	<p>B</p> <p>Lähes normaali/rajatapaus. Reisiluun pää ja lonkkamaljakkko ovat vähän epäyhdenmukaiset, Norbergin asteikko vetoasennossa läheillä 105° tai reisiluun pään keskus on mediaalisesti lonkkamaljakon dorsaalireunaan nähden ja reisiluun pää ja lonkkamaljakkko ovat yhdenmukaiset.</p> <p>Nästan normal/gränsfall. Caput och acetabulum är lätt inkongruenta, Norbergs vinkel är ungefär 105 grader eller centrum av caput ligger medialt om acetabulums dorsala rand och caput och acetabulum är kongruenta.</p> <p>Near normal hip joints. The femoral head and the acetabulum are slightly incongruent and the acetabular angle according to Norberg (adapted for Pos. I) is about 105° or the centre of the femoral head lies medial to the dorsal rim of the acetabulum and the femoral head and the acetabulum are congruent.</p>
<p>C</p> <p>Lievä. Reisiluun pää ja lonkkamaljakkko eivät ole yhdenmukaiset, Norbergin asteikko on noin 100° ja/tai lonkkamaljakon kraniolateraalinen reuna on vähän mataloitunut. Epätasaisuutta tai korkeintaan lievä nivelrikkomuutokset lonkkamaljan kranialikaudaali- tai dorsaalireunassa tai reisiluun päässä tai kaulassa.</p> <p>Lindrig dysplasi. Caput och acetabulum är inkongruenta, Norbergs vinkel är ungefär 100 grader och/eller acetabulums kraniolaterala del är litet grund. På acetabulums kraniala, kaudala eller dorsala rand, eller på caput eller collum femoris kan ses ojämnhet eller högst lindriga tecken på degenerativa ledförändringar (arthros).</p> <p>Mild hip dysplasia. The femoral head and the acetabulum are incongruent, the acetabular angle according to Norberg is about 100° and/or there is a slightly flattened craniolateral rim. Irregularities or no more than slight signs of osteoarthrotic changes of the margo acetabularis cranialis caudalis or dorsalis or on the femoral head and neck may be present.</p>	<p>D</p> <p>Kohtalainen. Selvä epätasaisuutta reisiluun päässä ja lonkkamaljakossa, subluxatio. Norbergin asteikko on suurempi kuin 90° (vain suosituksena). Lonkkamaljakon kranilateraalireuna tasaantunut ja/tai nivelrikon merkkejä.</p> <p>Måttlig dysplasi. Tydliga ojämnheter ses på caput och acetabulum, subluxation. Norbergs vinkel är större än 90 grader (endast som rekommendation). Acetabulums craniolaterala rand är avplanad och/eller tecken på degenerativa ledförändringar (arthros).</p> <p>Moderate hip dysplasia. Obvious incongruity between the femoral head and the acetabulum with subluxation. Acetabular angle according to Norberg more than 90° (only as a reference). Flattening of the craniolateral rim and/or osteoarthrotic signs.</p>
<p>E</p> <p>Vaikea. Selvästi dysplaattinen lonkanivel. Esim. luksaatio tai selvä subluksaatio, Norbergin asteikko alle 90°, selvä lonkkamaljakon kranialireunan tasaantuminen, reisiluun pään epämuotoisuus (sienimäinen, tasaantunut) tai muut nivelrikkomuutokset.</p> <p>Höggradig dysplasi. Tydligt dysplastisk höftled. T.ex. luxation eller tydlig subluxation, Norbergs vinkel mindre än 90 grader, tydlig avplaning av kraniala acetabulumranden, deformation av caput eller andra förändringar på grund av degenerativa ledförändringar (arthros).</p> <p>Severe hip dysplasia. Marked dysplastic changes of the hip joints, such as luxation or distinct subluxation, acetabular angle according to Norberg less than 90°, obvious flattening of the margo acetabularis cranialis, deformation of the femoral head (mushroom shaped, flattening) or other signs of osteoarthritis.</p>	<p>Tätä asteikkoa noudatetaan koiran 6 vuoden ikään saakka. Tämän jälkeen arvostelussa on otettava huomioon koiran ikä ja erityisesti sekundäärinivelrikko.</p> <p>Denna skala för HD-bedömning gäller för hundar upp till 6 års ålder, vid högre ålder bör speciellt åldersbeträffande sekundära arthros-förändringar beaktas.</p> <p>This classification has been made up on account of the radiological features only. It is as objective as possible. This classification scheme may be adopted for older dogs, but secondary arthrotic changes have then to be evaluated according to the age of the dog.</p>

Kyynärnivelen arvosteluasteikko - bedömningskala för armbågsled - classification of elbow examination

<p>0</p> <p>Ei muutoksia. Normaalit kyynärnivelet.</p> <p>Inga förändringar. Normala armbågsleder.</p> <p>No changes. Normal elbows.</p>	<p>1</p> <p>Lievät muutokset. Yleensä pienet artroosimuutokset ensiksi sulkijalisäkkeen yläpinnassa (2 mm vahvuuteen saakka).</p> <p>Lindriga förändringar. Små degenerativa ledförändringar (arthros) ses först som små pålagringer på processus anconeus (storleksgrad upp till 2 mm).</p> <p>Mild changes. Minimal osteophyte formation (less than 2 mm in any direction).</p>
<p>2</p> <p>Kohtaiset muutokset. Ed. mainittuja muutoksia 5 mm saakka ja/tai muutoksia värttinäluun nivelsingissä, koronoidi lisäkkeessä ja/tai lievä epämuodostusta.</p> <p>Måttliga förändringar. Påligringar på proc. anconeus 2-5 mm och/eller förändrin gar i radius och ulnas proximala ledtyta, proc. coronoidaeus medialis och/eller lindrig deformitet av ledeni.</p> <p>Moderate changes. Moderate osteophyte formation (2-5 mm).</p>	<p>3</p> <p>Voimakkaat muutokset. Edellistä yliitväät rappeutumismuutokset; voimakas niveling epämuodostus.</p> <p>Stora förändringar. Svårare degenerativa förändringar än i grad 2; stark deformation av ledeni.</p> <p>Severe changes. Severe osteophyte formation (more than 5 mm).</p>

Rtg-kuvat säilytetään Kennelliitossa FCI:n suositusten mukaisesti. Koiran omistajalle kuvat lähetetään lainaksi vain kirjallista pyyntöä vastaan. Mikäli omistaja on tyttymätön koiraansa saamaan lausuntoon, voidaan kuvat hän pyynnöstään arvioida SKL:n röntgenpaneelissa. Valitusaikea on 90 vuorokautta siitä, kun lausunto on postitettu Kennelliitosta. Kirjallisen valitukseen mukaan, joka lähetetään Kennelliiton tutkimusosastolle os. Kamreerintie 8, 02770 Espoo, on liittetä ävä kuitti suoritetusta valitusmaksusta (2 x lausuntomaksu; maksetaan tilille Danske Bank Oyj FI75 8000 1502 0746 78 DABAFIHH). Mikäli valitus osoittautuu aiheelliseksi, valitusmaksu palautetaan.

Rtg-bilderna arkiveras i Kennelklubben enligt FCI's rekommendation. Hundens ägare kan låna rtg-bilderna mot skriftlig begäran. Hundägaren kan skriftligen besäva sig över utlätande till FKK:s röntgenpanel. Besvärtiden är 90 dygn räknat från det datum utlätandet postats från Kennelklubben. Besväransöknan med bifogat kvitto på erlagd besvärvavgift (2 x utlätandets avgift; betalas på Danske Bank Oyj FI75 8000 1502 0746 78 DABAFIHH) skickas till Kennelklubbens Veterinärärådavdelning, Kamrersvägen 8, 02770 Esbo. Om besvärsförfarandet leder till korrigering av hundens resultat, returneras besvärsvavgiften.