



SUOMEN KENNELIITTO  
FINSKA KENNELKLUBBEN RY.



ALANNE RIIKKA  
PORAISTENTIE 524 A  
07190 HALKIA

### International Certificate

Lonkka/kynärniveldysplasia  
Höftled/armbågsledsdysplasi  
Hip/elbow dysplasia

Lausuntonumero  
Utlåtandenummer  
Certificate number

1038856

#### Koira - Hund - Dog

Nimi - Namn - Name	XPORT QUALITÉ DU GREFFIER DU ROI
Rek.numero - Reg.nummer - Reg.no.	FI10180/10
TM - ID	528140000376133
Syntynyt - Född - Born	07.07.2009
Sukupuoli - Kön - Sex	uros - hane - dog
Rotu - Ras - Breed	grand basset griffon vendéen grand basset griffon vendeen Grand Basset Griffon Vendéen

#### Kuvaus - Röntgen - X-ray

Kuvauspäivä - Röntgendiftat - X-ray date	12.05.2011
Kuvaaja - Veterinär - Veterinarian	AIJA LEINONEN

#### Tutkimustulos - Bedömningsresultat - Classification result

Lausuntopäivä - Bedömningsdatum - Date of evaluation	24.05.2011
Lausunnon antaja - Avläsande veterinär - Evaluation made by	ANNIE LIMAN
Lonkkanivel - Höftled - Hip	
vasen - vänster - left	B
oikea - höger - right	C
Kynärniveli - Armbågsled - Elbow	
vasen - vänster - left	0
oikea - höger - right	0

23.03.2012

Röntgenkuvat on arvosteltu Suomen Kennelliitossa FCI:n sääntöjen mukaisesti.  
Röntgenbilderna har bedömts i Finska Kennelklubben enligt FCI's bestämmelser.  
The evaluation was made at The Finnish Kennel Club according to the rules of F.C.I.

## FCI:n lonkkanivelen arvosteluasteikko - FCI HD gradering - FCI HD classification

Dortmund 14.6.1991

<p><b>A</b> <b>Ei muutoksia.</b> Reisiulin pää ja lonkkamajakko ovat yhdenmukaiset. Lonkkamajakon kraniolateralinen reuna piirtyy teräväänä ja on lievästi pyörristynyt. Nivelrako on tiivis ja tasainen. Norbergin asteikko vetoasennossa noin 105° (suosituksena).</p> <p><b>Normala höftleder.</b> Ledknappen (caput) och ledskålen (acetabulum) är kongruenta. Den kraniolaterala acetabulumranden är skarpt avtecknad, lätt avrundad. Ledspringan är smal och jämn. Norbergs vinkel (position 1) är ungefär 105 grader (rekommendation).</p> <p><b>No signs of hip dysplasia.</b> The femoral head and the acetabulum are congruent. The craniolateral rim appears sharp and slightly rounded. The joint space is narrow and even. The acetabular angle according to Norberg (adapted for Pos.I) is about 105° (as a reference). In excellent hip joints the craniolateral rim encircles the</p>	<p><b>B</b> <b>Lähes normaalirajatapaus.</b> Reisiulin pää ja lonkkamajakko ovat vähän epäyhdenmukaiset, Norbergin asteikko vetaasennossa läHELLÄ 105° tai reisiulin pään keskus on mediaalisesti lonkkamajakon dorsaalireunaan nähden ja reisiulin pää ja lonkkamajakko ovat yhdenmukaiset.</p> <p><b>Nästan normal/gränsfall.</b> Caput och acetabulum är lätt inkongruenta, Norbergs vinkel är ungefär 105 grader eller centrum av caput ligger medialt om acetabulums dorsala rand och caput och acetabulum är kongruenta.</p> <p><b>Near normal hip joints.</b> The femoral head and the acetabulum are slightly incongruent and the acetabular angle according to Norberg (adapted for Pos. 1) is about 105° or the centre of the femoral head lies medial to the dorsal rim of the acetabulum and the femoral head and the</p>
<p><b>C</b> <b>Lievä.</b> Reisiulin pää ja lonkkamalja eivät ole yhdenmukaiset, Norbergin asteikko on noin 100° ja/tai lonkkamajakon kraniolateralinen reuna on vähän mataloitunut. Epätasaisuutta tai korkeintaan lievä nivelrikku-muutoksiä lonkkamajan kranialikaudaali- tai dorsaalireunassa tai reisiulin päässä tai kaulassa.</p> <p><b>Lindrig dysplasi.</b> Caput och acetabulum är inkongruenta, Norbergs vinkel är ungefär 100 grader och/eller acetabulums kraniolaterala del är litet grund. På acetabulums kraniala, kaudala eller dorsala rand, eller på caput eller collum femoris kan ses ojämnhet eller högst lindriga tecken på degenerativa ledförändringar (arthros).</p> <p><b>Mild hip dysplasia.</b> The femoral head and the acetabulum are incongruent, the acetabular angle according to Norberg is about 100° and/or there is a slightly flattened craniolateral rim. Irregularities or no</p>	<p><b>D</b> <b>Kohtalainen.</b> Selvä epätasaisuutta reisiulin päässä ja lonkkamajakossa, subluxatio. Norbergin asteikko on suurempi kuin 90° (vain suosituksena). Lonkkamajakon kraniolateraalireuna tasaantunut ja/tai nivelrikon merkkejä.</p> <p><b>Måttlig dysplasi.</b> Tydliga ojämnheter ses på caput och acetabulum, subluxation. Norbergs vinkel är större än 90 grader (endast som rekommendation). Acetabulums kraniolaterala rand är avplanad och/eller tecken på degenerativa ledförändringar (arthros).</p> <p><b>Moderate hip dysplasia.</b> Obvious incongruity between the femoral head and the acetabulum with subluxation. Acetabular angle according to Norberg more than 90° (only as a reference). Flattening of the craniolateral rim and/or osteoarthrotic signs.</p>
<p><b>E</b> <b>Vaikea.</b> Selvästi dysplaattinen lonkkanivel. Esim. luksaatio tai selvä subluksaatio, Norbergin asteikko alle 90°, selvä lonkkamajakon kranialaireunan tasaantuminen, reisiulin pään epämuotoisuus (siennimäinen, tasaantunut) tai muut nivelrikkomuutokset.</p> <p><b>Höggradig dysplasi.</b> Tydligt dysplastisk höftled. T.ex. luxation eller tydlig subluxation, Norbergs vinkel mindre än 90 grader, tydlig avplaning av kraniala acetabulumranden, deformation av caput eller andra förändringar på grund av degenerativa ledförändringar (arthros).</p> <p><b>Severe hip dysplasia.</b> Marked dysplastic changes of the hip joints, such as luxation or distinct subluxation, acetabular angle according to Norberg less than 90°, obvious flattening of the margo acetabularis cranialis, deformatin of the femoral head (mushroom shaped,</p>	<p>Tätä asteikkoa noudatetaan koiran 6 vuoden ikään saakka. Tämän jälkeen arvostelussa on otettava huomioon koiran ikä ja erityisesti sekundäärinivelrikko.</p> <p>Denna skala för HD-bedömning gäller för hundar upp till 6 års ålder, vid högre ålder bör speciellt åldersbeträffande sekundära arthros-förändringar beaktas.</p> <p>This classification has been made up on account of the radiological features only. It is as objective as possible. This classification scheme may be adopted for older dogs, but secondary arthrotic changes have then to be evaluated according to the age of the dog.</p>

## Kyynärnivelen arvosteluasteikko - bedömningskala för armbågsled - classification of elbow examination

<p><b>0</b> <b>Ei muutoksia.</b> Normaalit kyynärnivelet.</p> <p><b>Inga förändringar.</b> Normala armbågsleder.</p> <p><b>No changes.</b> Normal elbows.</p>	<p><b>1</b> <b>Lievät muutokset.</b> Yleensä pienet arthroosimuutokset ensiksi sulkijalisäkkeen yläpinnassa (2 mm vahvuuteen saakka).</p> <p><b>Lindriga förändringar.</b> Små degenerativa ledförändringar (arthros) ses först som små pålageringar på processus anconeus (storleksgrad upp till 2 mm).</p> <p><b>Mild changes.</b> Minimal osteophyte formation (less than 2 mm in any</p>
<p><b>2</b> <b>Kohtaiset muutokset.</b> Ed. mainittuja muutoksia 5 mm saakka ja/tai muutoksia värttinäluun niveloissa, koronoidi lisäkkeessä ja/tai lievä epämuodostusta.</p> <p><b>Måttliga förändringar.</b> Pålageringar på proc. anconeus 2-5 mm och/eller förändringar i radius och ulnas proximala ledtyta, proc. coronoidaeus medialis och/eller lindrig deformitet av ledet.</p>	<p><b>3</b> <b>Voimakkaat muutokset.</b> Edellistä yliittävät rappeutumismuutokset; voimakas nivelen epämuodostus.</p> <p><b>Stora förändringar.</b> Svårare degenerativa förändringar än i grad 2; stark deformation av ledet.</p> <p><b>Severe changes.</b> Severe osteophyte formation (more than 5 mm).</p>

Rtg-kuvat säilytetään Kennelliitossa FCI:n suositusten mukaisesti. Koiran omistajalle kuvat lähetetään lainaksi vain kirjallista pyyntöä vastaan. Mikäli omistaja on tytymätön koiransa saamaan lausuntoon, voidaan kuvat hänен pyynnöstään arvioida SKL:n röntgenpaneelissa. Valitusaika on 90 vuorokautta siitä, kun lausunto on postitettu Kennelliitosta. Kirjallisen valituksen mukaan, joka lähetetään Kennelliiton tutkimusosastolle os. Kamreerintie 8, 02770 Espoo, on liitetty ävä kuitti suoritetusta valitusmaksusta (2 x lausuntomaksu; maksetaan tilille SAMPO 800011-60558). Mikäli valitus osoittautuu aiheelliseksi, valitusmaksu palautetaan.

Rtg-bilder arkiveras i Kennelklubben enligt FCI's rekommendation. Hundens ägare kan låna rtg-bilderna mot skriftlig begäran. Hundägaren kan skriftligen besvär sig över utlättande till FKK:s röntgenpanel. Besvärtiden är 90 dygn räknat från det datum utlättande postats från Kennelklubben. Besvärsansökan med bifogat kvitto på erlagd besvärsavgift (2 x utlättandets avgift; betalas på SAMPO 800011-60558) skickas till Kennelklubbens Veterinäravdelning, Kramersvägen 8, 02770 Esbo. Om besvärsförfarandet leder till korrigering av hundens resultat, returneras besvärsavgiften.